

ОТЗЫВ

*на автореферат диссертации Носова Александра Константиновича на тему:
«Малоинвазивное органосохраняющее лечение клинически локализованного рака почки»,
представленную на соискание ученой степени доктора медицинских наук по
специальности: 3.1.6 – Онкология, лучевая терапия.*

Актуальность темы диссертационной работы Александра Константиновича Носова не вызывает сомнений и посвящена одной из актуальных проблем современной онкологии, которая приобрела на сегодняшний день особую актуальность вследствие неуклонного роста показателей заболеваемости и смертности. При анализе данных, за последние годы отмечается убедительный рост числа больных с локализованными формами рака почки, среди этих опухолей большой процент может быть представлена доброкачественными образованиями. Эти факты подтверждают, что в большинстве случаев нефрэктомия будет избыточным вариантом лечения, а малоинвазивное органосохраняющее хирургическое вмешательство становится методом выбора.

Актуальным вопросом в хирургическом лечении рака почки остается, проблема потери и снижения суммарной выделительной функции органа, что проявляется хронической болезнью почек, которая является важным негативным фактором риска общей выживаемости этих пациентов.

В работе рассмотрен вариант открытого хирургического доступа к почке с минимальным травматическим эффектом, который был разработан для резекции почки по поводу опухоли. Рассматриваемые в диссертации аблятивные методы и техника лапароскопической резекции без ишемии и без наложения гемостатического шва обеспечивают максимальное сохранение функционирующей части почки, сохраняя суммарную выделительную функцию в пределах нормальных показателей.

Разработка и развитие, а также индивидуальный подбор методик локального лечения ранних форм рака почки остается важной задачей. Ее решение позволит обеспечить максимально эффективное лечение этих больных. Приоритетом в хирургическом лечении рака почки является выбор метода с сохранением функции органа.

Научная новизна и практическая значимость обусловлена тем, что в настоящей работе показана целесообразность раннего выявления РП в группе молодого возраста, что приводит к снижению смертности в средней возрастной группе, в которой отсутствовала тенденция проведения ранних скрининговых исследований. Данная информация может внести существенный вклад в составление программы диспансеризации взрослого населения.

